

## FEBENDAFAR 20 %®

Antiparasitario interno

Vía oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Febendadozole.....20 g

Excipientes c.s.p.....100 ml

INDICACIONES: Recomendado para el tratamiento de parasitos en: Bovinos, ovinos, caprinos: *Haemonchus* sp., *Ostertagia* sp., *Cooperia* sp., *Oesophagostomun* sp., *Chabertia* sp., *Bunostomun* sp., *Trichuris* sp., *Neoascaris vitulorum*, *Capillaria* sp., *Strongyloides* sp., *Dictyocaulus* sp., *Trichostrongylus* sp., *Monienzia* sp.

Porcinos: *Oesophagostomun* sp., *Trichuris* sp.

Equinos: *Strongyloides* sp., *Neoascaris* sp., *Paracaris ecirom*, *Trichostrongylus axei*, *Oxyurus* sp.

Caninos: *Ascaris* sp., *Trichuris* sp., *Capillaria* sp.

DOSIS: La dosis recomendada es:

ESPECIES	DOSIS	
BOVINOS	5-7.5 mg/kg	2.5-3.75 ml/100 kg
OVINOS-CAPRINOS	5 mg/kg	1 ml/40 kg
EQUINOS	7.5 mg/kg	15 ml/400 kg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PRECAUCIONES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz entre 8º y 25º C.
- Humedad relativa: 40-70 %.
- No hay tiempo de retiro en leche para animales tratados con el producto.
- Animales tratados con el producto no deben ser sacrificados para consumo humano hasta después de 15 días de la aplicación del producto.

PRESENTACIÓN:

Jeringa x 5 ml.

Jeringa x 10 ml.

Jeringa x 15 ml.

Jeringa x 20 ml.

Frasco x 50 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 250 ml.

Frasco x 500 ml.

Frasco x 1 litro.

Galón.

Caneca

REGISTRO SANITARIO: 3A-13972-AGROCALIDAD.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: INDUFAR ECUADOR























