

LEVAMISOL 12% + AD₃E®

Antiparasitario de amplio espectro vitaminado
Injectable



COMPOSICIÓN: Cada 10 ml contiene:

Clorhidrato de levamisol.....12 g
Vitamina A.....2 000 000.00 UI
Vitamina D₃.....300 000.50 UI
Vitamina E.....200 000.50 UI
Excipientes c.s.p.....100 ml

CARACTERÍSTICAS: LEVAMISOL + AD₃E es un antihelmíntico de amplio espectro indicado para el control eficaz de parásitos gastrointestinales y pulmonares, aportando a la vez las vitaminas esenciales para el crecimiento, evitar alteraciones en piel y mucosas y corrección de deficiencias reproductivas.

INDICACIONES: Para el tratamiento del parasitismo gastrointestinal y pulmonar y para suplir deficiencias de vitaminas AD₃E en bovinos, ovinos y porcinos.

LEVAMISOL ESPECTRO DE ACCIÓN: Eficaz contra los siguientes parásitos:

BOVINOS - OVINOS:

Pulmonares: *Dictyocaulus* spp., *Protostrongylus*.

Gástricos: *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp.

Intestinales: *Bunostomum* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Oesophagostomum* spp., *Trichostrongyloides*, *Chabertia* spp., *Ascaris* spp.

PORCINOS:

Pulmonares: *Metastrongylus* spp.

Gastrointestinales: *Hyostrongylus* spp., *Trichuris* sp., *Ascaris* spp., *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides*.

VITAMINA AD₃E RECOMENDACIONES: Raquitismo osteomalacia, crecimiento deficiente, fracturas espontáneas.

En alteraciones reproductivas como trastornos en la ovulación, infertilidad en hembras en gestación, el aborto o nacimiento de crías débiles, fallas en la espermatogénesis. Las vitaminas AD₃E intervienen en la formación y protección de la piel y mucosas, en el metabolismo de calcio, fósforo y carbohidratos.

Estimula la formación de anticuerpos aumentando la resistencia contra enfermedades infecciosas.

DOSIS: Administrar por vía intramuscular profunda en los músculos del cuello o del anca en dosis de 1 ml por cada 20 kg de peso sin sobrepasar la dosis máxima de 15 ml.

TABLA DE DOSIFICACIÓN DE LEVAMISOL 12%+AD₃E:

| PESO (kg) | DOSIS (ml) |
|-----------|------------|
| 20 | 1 |
| 40 | 2 |
| 60 | 3 |
| 100 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 o más | 15 |

PRECAUCIONES: Al administrarse **LEVAMISOL 12% + AD₃E**

puede producirse síntomas pasajeros como:

- Salivación excesiva, temblores musculares, respiración acelerada.
- Si se presentase shocks anafilácticos deben ser tratados rápidamente con la administración de antihistamínicos o epinefrina.
- Este producto no debe usarse en caballos, asnos y mulares.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 500 ml.

REGISTRO SANITARIO: 3A1-11720-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: INDUFAR ECUADOR.